

APPROFONDIMENTO

Le formule di sdoppiamento

La retta tangente ad un'iperbole passante per un suo punto $P(x_0, y_0)$ si può determinare applicando le formule di sdoppiamento e sostituendo:

- x_0x al posto di x^2
- y_0y al posto di y^2

Scriviamo l'equazione della retta tangente all'iperbole di equazione $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{20} = -1$ nel suo punto P di ascissa 5 e ordinata positiva.

Calcoliamo l'ordinata di P :


$$\frac{25}{5} - \frac{y^2}{20} = -1 \quad \rightarrow \quad y = \pm 2\sqrt{30} \quad \rightarrow \quad P(5, 2\sqrt{30})$$

Le sostituzioni da eseguire nell'equazione della curva sono le seguenti:

$$5x \quad \text{al posto di} \quad x^2 \qquad 2\sqrt{30}y \quad \text{al posto di} \quad y^2$$

Operando tali sostituzioni otteniamo:

$$\frac{5x}{5} - \frac{2\sqrt{30}y}{20} = -1 \quad \rightarrow \quad 10x - \sqrt{30}y + 10 = 0$$



ESERCIZI

Scrivi l'equazione della retta tangente all'iperbole nei seguenti casi.

1 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{6} = -1$ nel suo punto P di ascissa 2 e ordinata positiva [$2x - \sqrt{2}y + 2 = 0$]

2 $\frac{x^2}{15} - \frac{y^2}{20} = 1$ nel suo punto P di ascissa -4 e ordinata negativa [$8x + \sqrt{3}y + 30 = 0$]

3 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{6} = -1$ nei suoi punti P di ordinata $2\sqrt{3}$ [$x - \sqrt{3}y + 3 = 0$; $x + \sqrt{3}y - 3 = 0$]

4 $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1$ nei suoi punti P di ascissa $3\sqrt{3}$ [$x + \sqrt{6}y - \sqrt{3} = 0$; $x - \sqrt{6}y - \sqrt{3} = 0$]